

Werte Kolleginnen und Kollegen,

bei dem an der KUG verwendeten Desinfektionsmittel Apesin-Spray handelt es sich um ein Desinfektionsmittel welches ausschließlich alkoholische, schnell abdampfende biozide Wirkstoffe enthält.

Apesin-Spray ist gebrauchsfertig und immer in unverdünnter Form anzuwenden. Das Produkt eignet sich zur Sprüh- bzw. Flächendesinfektion. Dabei ist aber zu beachten, dass geringfügige Mengen an Inhaltsstoffen auf den Flächen zurückbleiben. **Das Produkt darf nicht auf alkoholempfindlichen Gegenständen oder Flächen wie z.B. Acrylglas angewendet werden!**

Anwendung:

Zur Desinfektion von Schlüsseln diese aus ca. 20 cm auf einem Stück Küchenrolle liegend besprühen und mit einem Tuch trockenwischen.

Sicherheitsmassnahmen/Erste Hilfe:

- Bitte achten Sie bei Verwendung von Apesin-Spray auf **ausreichende Lüftung!**
- Nach Berührung mit den Augen, Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung Facharzt aufsuchen.
- Nach Aufnahme durch Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sicherer Umgang:

- Bei unzureichender Belüftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-/Luft-Gemische. → Bitte achten Sie bei Verwendung von Apesin-Spray auf **ausreichende Lüftung!**
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
- Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Bitte beachten Sie das aufliegende Sicherheitsdatenblatt!

Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an mich unter friedrich.pichler@kug.ac.at oder +43 664 88761841.

Mit kollegialen Grüßen

Friedrich Pichler